

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F. Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 000 28 0



80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 17 - 12 juin 1987

COLZA*Alternaria : Pas de traitement dans l'immédiat***POIS***Botrytis : Début floraison vers le 1/6 : traitement la semaine prochaine**Tordeuse : Localement, traitements à réaliser ... et à prévoir***TOURNESOL***Pucerons : A surveiller ... décision la semaine prochaine***CULTURES LEGUMIERES***Mildiou : Intervenir sur Mildiou pomme de terre et oignon***COLZA****ALTERNARIA****SITUATION :**

- Peu ou pas de progression des symptômes d'Alternaria depuis le bulletin précédent. Les taches "noires" sont toujours localisées aux feuilles basses.
- Avec le relèvement des températures, les conditions météorologiques actuelles sont favorables à cette maladie.

PRECONISATION : Pas de traitements dans l'immédiat. Attendre.**POIS****MALADIES****SITUATION :**

- Absence d'Anthracnose
- Depuis une semaine, développement de petits foyers de Botrytis sur les gousses et (ou) sur les feuilles, à partir des pétales.
- Les conditions météorologiques actuelles sont favorables à cette maladie.

PRECONISATIONS :

- Parcelles en début floraison vers le 1er juin, un traitement fongicide est à envisager dans le courant de la semaine prochaine. Utiliser des spécialités efficaces sur Botrytis : Céréclair - Bravo Plus 2 l/ha, B.T.F. 3,5 l/ha Folgan 3 kg/ha.
- Dans les situations plus tardives (début floraison vers le 10/06) il est trop tôt pour intervenir.

P.132

TORDEUSE DU POIS

SITUATION :

- YONNE : Sens (Evry) 17 ; Lixy 69 ; Champlost 169 ; Senan 49 ; Commissey 10.
- COTE-D'OR : Longchamps 14 ; Champdôtre 24 ; Binges 44 ; Brétigny 29 ; Epoisses 73 ; Nuits-St-Georges 1 ; Aignay-le-Duc 1.
- NIEVRE : St-Martin S/Nohain (Donzy) 176 ; Varzy 1.

PRECONISATIONS :

- NIEVRE : Secteur de Donzy : un traitement est à prévoir dans le courant de la semaine prochaine (cf bulletin précédent)
 - YONNE : Secteur de Champlost (Jovinien)
 - COTE-D'OR : Très localement sur Epoisses
 - Dans les autres petites régions, ne pas envisager de traitement insecticide dans l'immédiat.
- Traitement insecticide à prévoir dans la période du 20 au 25 juin

PUCERONS

SITUATION : Dans l'ensemble très peu fréquents.

PRECONISATION : Les traitements ne sont pas justifiés, sauf localement dans des situations particulières.

TOURNESOL

PUCERONS

Les deux espèces rencontrées sur tournesol sont :

- Le puceron vert du prunier (Brachycaudus helichrysi) : le plus fréquent
- Le puceron noir de la fève (Aphis fabae)

Les informations des essais et suivis réalisés depuis plusieurs années :

- L'évolution des populations est dépendante de la date d'arrivée des pucerons sur les parcelles, des conditions météorologiques ultérieures (températures en mai-juin-juillet), et de l'importance des auxiliaires (coccinelles, chrysopes, syrphes...)

Les fluctuations peuvent se faire rapidement.

- Depuis 1984, la nuisibilité des pucerons n'a été mise en évidence que dans deux essais sur environ 20 mis en place.
- Après le stade 2-4 feuilles du tournesol ; les niveaux d'intervention retenus sont élevés, de l'ordre de 100 pucerons/plante.

Le meilleur positionnement de traitement est le stade E (bouton étoilé)

Les spécialités utilisables doivent respecter la faune auxiliaire : Pirimor 0,25 kg/ha, Serk 1,5 l/ha.

SITUATION :

Présence très fréquente de pucerons : Les niveaux de populations le plus souvent rencontrés sont de 20-30 pucerons/plante ; ces niveaux sont en augmentation constante depuis 3 semaines.

PRECONISATION :

- Ne pas intervenir dans l'immédiat. Surveiller l'évolution.
- Attendre la semaine prochaine pour prendre la décision. La majorité des parcelles de tournesol sera au stade bouton floral, et le prochain bulletin du 17/06 donnera des informations sur l'évolution récente des populations.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU

Pomme-de-terre : Des contaminations ont pu se produire la semaine dernière. Le maintien des conditions actuelles est favorable à de nouvelles contaminations. Assurer une couverture fongicide en utilisant l'un des produits cités dans le bulletin n° 15 du 26 mai 1987. Tenir compte de la rémanence des produits et du lessivage par les pluies.

Oignon : Des foyers de Mildiou sont signalés. La période humide que nous connaissons est propice au développement de la maladie.

Maintenir la protection avec l'une des spécialités suivantes : Sygan - 0,36 kg/hl, Sygan L - 0,25 l/hl, Fulvax, Remiltine, Remiltine S - 0,25 kg/hl ; Pulsan - 0,25 kg/hl.

Ajouter à la bouillie un produit efficace sur Botrytis et Sclerotinia.

*

*

*